

Vivre avec une chambre à cathéter implantable



Une chambre à cathéter implantable permet de pratiquer des injections et des perfusions. Elle nécessite des précautions simples et une surveillance attentive.

● Une chambre à cathéter implantable est composée d'un petit boîtier relié à un tube souple (cathéter). Une petite intervention chirurgicale permet de placer l'ensemble sous la peau, souvent au haut du thorax. Le cathéter est mis en place dans une veine : les médicaments injectés ou perfusés dans le boîtier vont alors directement dans la circulation sanguine.

● Ce dispositif est utile lorsque des injections fréquentes ou des médicaments agressifs (comme certains médicaments anticancéreux) risquent d'endommager les veines et de provoquer des effets indésirables.

● Une chambre à cathéter implantable peut rester en place plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais elle impose quelques précautions et une surveillance afin de détecter de possibles complications.

Quelques précautions à prendre

● Quelques jours après la pose, lorsque la peau a cicatrisé, il est possible de se baigner et de se doucher normalement. Il est aussi possible de porter une ceinture de sécurité et de passer par les portiques de sécurité des aéroports, magasins, etc.

● Lorsque la chambre à cathéter est mise en place au haut du thorax (cas fréquent), certains sports doivent être évités, en particulier ceux qui imposent de grands mouvements des épaules (crawl, tennis, volley, haltérophilie, etc.). Mieux vaut aussi éviter le port de bretelles serrées.

● Il est indispensable de signaler la présence d'une chambre à cathéter implantable avant les examens d'imagerie, en particulier par résonance magnétique (IRM).

Savoir reconnaître une complication

● La personne qui porte la chambre implantable est bien placée pour détecter les complications qui apparaissent quelquefois. De manière générale, une fois que la peau a cicatrisé après la pose, une chambre à cathéter implantable ne devrait pas entraîner de gêne particulière.

● Une douleur, un aspect rouge, chaud et gonflé autour du lieu d'implantation, avec ou sans fièvre, des frissons ou un écoulement font craindre une infection, surtout lorsque les signes apparaissent quelques heures après la manipulation du dispositif.

● Une douleur, un gonflement et une zone localement dure font penser que le cathéter ou la veine ont pu se boucher, parfois à cause d'un caillot.

● Une douleur, un aspect rouge, chaud et gonflé apparaissant très rapidement après l'injection évoquent une fuite du produit en dehors de la chambre. Cette complication peut être grave si le produit injecté est très agressif.

● Dans tous les cas, signaler rapidement toute anomalie ou manifestation inhabituelle à l'infirmière ou au médecin traitant.

Ne pas oublier le carnet

● Après la mise en place d'une chambre à cathéter implantable, un carnet d'entretien doit être remis au patient. Ce carnet indique en particulier les caractéristiques de la chambre et ses précautions d'utilisation.

● Il est important de penser à le montrer aux soignants pour qu'ils y notent leurs gestes d'entretien et manipulations, ainsi que les complications éventuelles.

©Prescrire - juin 2013

Sources :

- "Les chambres à cathéter implantables : les bases pour une utilisation optimale" *Rev Prescrire* 2009 ; **29** (305) : 194-201.