

IPSS : 7 questions dont les réponses sont cotées de 0 à 5 :

- 0..... Jamais
- 1..... Environ 1 fois sur 5
- 2..... Environ 1 fois sur 3
- 3..... 1 fois sur 2
- 4..... 2 fois sur 3
- 5..... Presque toujours

QUESTIONNAIRE

Au cours du dernier mois avec quelle fréquence avez vous eu la sensation que votre vessie n'était pas complètement vidée ?	
Au cours du dernier mois avec quelle fréquence avez vous eu besoin d'uriner moins de 2 heures après une miction ?	
Au cours du dernier mois avec quelle fréquence avez vous eu une interruption du jet d'urine c'est à dire démarrage de la miction puis arrêt puis redémarrage ?!	
Au cours du dernier mois après avoir ressenti le besoin d'uriner, avec quelle fréquence avez vous eu des difficultés à retenir votre miction ?	
Au cours du dernier mois avec quelle fréquence avez vous eu une diminution de la taille et de la force du jet ?	
Au cours du dernier mois avec quelle fréquence avez vous du forcer ou pousser pour commencer à uriner ?!	
Au cours du dernier mois écoulé, combien de fois par nuit, en moyenne, vous êtes-vous levé pour uriner (entre le moment de votre coucher le soir et celui de votre lever définitif le matin ?	
Votre total : score IPSS (0 à 35)	

RESULTATS IPSS

Total des 7 items

- 0 - 7 Peu symptomatique
- 7 - 19 Modérément symptomatique
- 20 - 35..... Symptômes sévères

SCORE DE QUALITE DE VIE : QDV

Si vous deviez vivre le restant de votre vie avec cette manière d'uriner, diriez-vous que vous en seriez :

1. Très satisfait
2. Satisfait
3. Plutôt satisfait
4. Partagé : ni satisfait si ennuyé
5. Plutôt ennuyé
6. Ennuyé
7. Très ennuyé