

**Tableau 1. Insulines couramment utilisées pour les patients diabétiques**

<p>Insulines retard (type NPH)</p> <p>Temps d'action de ces insulines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 2 heures</li> <li>• Maximum : environ 6 à 10 heures</li> <li>• Fin : environ 18 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Lilly : Huminsulin® Basal</p> <p>Laboratoire Novo : Insulatard®</p>	<p>Extra-rapides (analogues rapides)</p> <p>Temps d'action de ces insulines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 10 minutes → il faut piquer et manger tout de suite</li> <li>• Maximum : environ 40 minutes</li> <li>• Fin : environ 2 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Lilly : Humalog®</p> <p>Laboratoire Novo : Novorapid®</p> <p>Laboratoire Sanofi-Aventis : Apidra®</p>
<p>Insulines rapides</p> <p>Temps d'action de ces insulines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 30 minutes</li> <li>• Maximum : environ 2 à 4 heures</li> <li>• Fin : environ 6 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Lilly : Huminsulin® Normal</p> <p>Laboratoire Novo : Actrapid®</p>	<p>Mélanges avec analogues rapides</p> <p>Temps d'action de ces insulines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 10 minutes → il faut piquer et manger tout de suite</li> <li>• Maximum : environ 40 minutes puis 6 à 10 heures</li> <li>• Fin : environ 18 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Lilly : Humalog® Mix 25 ou 50 = Huminsulin® Basal + Humalog®</p> <p>Laboratoire Novo : Novomix® 30 = Insulatard® + Novorapid®</p>
<p>Mélanges</p> <p>Temps d'action de ces insulines :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 30 minutes</li> <li>• Maximum : environ 2 à 4 heures puis 6 à 10 heures</li> <li>• Fin : environ 18 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Lilly : Huminsulin® Profil = Huminsulin® Basal + Normal</p> <p>Laboratoire Novo : Mixtard® = Insulatard® + Actrapid®</p> <p>Il existe différents pourcentages : Mixtard® 10, 20, 30, 40, 50%</p>	<p>Analogues lents</p> <p>Laboratoire Novo : Levemir®</p> <p>Temps d'action de cette insuline :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 1 heure puis profil plus ou moins plat pendant environ 18 heures</li> </ul> <p>Laboratoire Sanofi-Aventis : Lantus®</p> <p>Temps d'action de cette insuline :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Début : environ 1 heure puis profil quasiment plat pendant 23-24 heures</li> </ul>