

Retour au
Sommaire

Rhinites allergiques

Classification des rhinites allergiques

La classification ARIA publiée en 2001 propose une répartition des rhinites allergiques (RA) en : Rhinite intermittente (RAI) et rhinite allergique persistante (RAP) rejoignant ainsi la classification adoptée pour l'asthme

De récentes études ont mis en évidence les discordances séparant l'ancienne et la nouvelle classification : en effet, à partir des critères définis par la nouvelle classification, au sein d'une cohorte de patients porteurs de rhinite allergique, le groupe de patients porteurs de rhinite allergique dite saisonnière (51%), ne comporte plus que 33% de RAI tandis que le groupe des rhinites perannuelles (49%) s'élargit à 67% en RAP.

La polysensibilisation allergénique peut expliquer en partie cette discordance, témoignant de l'hétérogénéité d'expression du terrain atopique au sein de la population allergique

<i>Critères de la classification ARIA des Rhinites allergiques (RA)</i>	
<i>Selon le déroulement des manifestations dans le temps</i>	<i>Selon l'intensité des manifestations</i>
<p>RA intermittente</p> <ul style="list-style-type: none">• < 4 jours / semaine• ou < 4 semaines <p>RA persistante</p> <ul style="list-style-type: none">• > 4 jours / semaine• et > 4 semaines	<p>RA légère</p> <ul style="list-style-type: none">• Sommeil et activités diverses non perturbées• Bonne tolérance subjective <p>RA modérée à sévère</p> <ul style="list-style-type: none">• Sommeil et activités perturbées• Mauvaise tolérance subjective

Retour
Haut de page

Page
Suivante